

# ¿Qué necesito saber después de cada dosis de PLUVICTO?


## 1. Ayude a reducir su exposición y la de otras personas a la radiación

Tras recibir PLUVICTO, su cuerpo, sangre, sudor y orina emitirán radiación por un tiempo. Por eso, es importante que siga estas instrucciones. Para todas estas instrucciones, cuente como **Día 1** el día *después* de la administración de PLUVICTO.



### Manténgase hidratado

Durante **1 día**, beba abundante cantidad de líquido y orine con la mayor frecuencia posible



### Manténgase a más de 3 pies de otras personas

Durante **2 días**, de otros adultos

Durante **7 días**, de niños menores de 18 años o embarazadas



### Duerma solo en una habitación separada

Durante **3 días**, lejos de otros adultos

Durante **7 días**, lejos de niños

Durante **15 días**, lejos de embarazadas



### En un principio, absténgase de la actividad sexual, y luego utilice un método anticonceptivo eficaz

Durante **7 días**, absténgase de la actividad sexual

Durante el tratamiento y por **14 semanas después de la última dosis**, utilice un método anticonceptivo eficaz para evitar embarazos



### Tome precauciones al utilizar el baño

Utilice un **baño separado**, de ser posible, y límpielo después de usarlo

Durante **2 días**, siéntese siempre para utilizar el inodoro y tire el papel higiénico por el inodoro

Durante **3 días**, si alguien lo ayuda en el baño, esa persona deberá utilizar guantes desechables



### Dúchese todos los días

Durante **7 días**, dúchese al menos una vez al día



### Lave su ropa por separado

Durante el tratamiento, lave su ropa separada de la de otras personas

**Tenga en cuenta que el tratamiento puede causar infertilidad**

## 2. Preste atención a los efectos secundarios durante el tratamiento y después de este

Informe a su médico de cualquier efecto secundario que tenga, ya que podría haber opciones para ayudarlo.

### Los efectos secundarios más frecuentes de PLUVICTO incluyen:

- Cansancio
- Pérdida del apetito
- Niveles bajos en el recuento de plaquetas (hemorragias o aparición de hematomas con más facilidad que lo normal)
- Sequedad de boca
- Cambios en las deposiciones (estreñimiento o diarrea)
- Infección urinaria
- Náuseas (dolor abdominal)
- Vómitos
- Pérdida de peso
- Niveles bajos en el recuento de glóbulos rojos (sensación de debilidad o falta de aire)
- Dolor abdominal

## 3. Planifique con su médico la próxima cita para hacerse análisis de sangre

Tendrá que volver a hacerse análisis de sangre entre 1 y 2 semanas antes de la próxima administración de PLUVICTO.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web [PLUVICTO.com](http://PLUVICTO.com) o comuníquese con su médico



Consulte la Información de Seguridad Importante al dorso.

# Información de Seguridad Importante

## ¿Qué es PLUVICTO® (lutecio [177Lu] vipivotida tetraxetano)?

PLUVICTO es un radiofármaco que se utiliza para tratar a personas adultas con un tipo de cáncer avanzado denominado cáncer de próstata metastásico resistente a la castración con antígeno membranario específico de la próstata (mCRPC PSMA positivo) que:

- se ha diseminado a otras partes del cuerpo (metastásico) y
- ya se ha abordado con otros tratamientos antineoplásicos

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

### ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre PLUVICTO?

El uso de PLUVICTO implica exposición a la radiactividad. La exposición acumulada a la radiación a largo plazo está asociada con un mayor riesgo de cáncer.

Para reducir al mínimo la exposición a la radiación de otras personas después de la administración de PLUVICTO, limite el contacto estrecho (menos de 3 pies) con otros integrantes de su hogar durante 2 días, o con niños y embarazadas durante 7 días, absténgase de la actividad sexual durante 7 días y duerma en una habitación separada de otras personas durante 3 días, de niños durante 7 días o de embarazadas durante 15 días.

### PLUVICTO puede causar efectos secundarios graves, como los siguientes:

- **Niveles bajos en el recuento de glóbulos sanguíneos.** Informe de inmediato a su médico si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, por ejemplo:
  - Cansancio o debilidad
  - Piel pálida
  - Dificultad para respirar
  - Hemorragias o moretones que aparecen más fácilmente que lo habitual o dificultad para detener las hemorragias
  - Infecciones frecuentes con signos como fiebre, escalofríos, dolor de garganta o aftas
- **Problemas renales.** Informe de inmediato a su médico si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, por ejemplo, orinar con menos frecuencia o menor cantidad que la habitual

### Antes de recibir PLUVICTO, informe a su médico si cualquiera de las siguientes afirmaciones se aplica a usted:

- Tiene niveles bajos en el recuento de células sanguíneas (hemoglobina, recuento de glóbulos blancos, recuento absoluto de neutrófilos, recuento de plaquetas)

- Tiene o ha tenido cansancio, debilidad, piel pálida, dificultad para respirar, hemorragias o moretones que aparecen más fácilmente que lo habitual o dificultad para detener las hemorragias, o infecciones frecuentes con signos como fiebre, escalofríos, dolor de garganta o aftas (posibles signos de mielosupresión)
- Tiene o ha tenido problemas renales
- Tiene o ha tenido otros tipos de cáncer o recibe o ha recibido tratamientos para el cáncer, dado que PLUVICTO contribuye a su exposición acumulada a la radiación a largo plazo
- Usted es sexualmente activo:
  - Todos los radiofármacos, incluido PLUVICTO, pueden causar daños al feto
  - Debe usar un método anticonceptivo eficaz si mantiene relaciones sexuales durante el tratamiento con PLUVICTO y por 14 semanas después de la última dosis
  - PLUVICTO puede causar infertilidad temporal o permanente

**Antes de la administración de PLUVICTO, debe beber abundante cantidad de agua para orinar con la mayor frecuencia posible durante las primeras horas posteriores a la administración.**

### Los efectos secundarios más frecuentes de PLUVICTO incluyen:

- Cansancio
- Sequedad de boca
- Náuseas
- Niveles bajos en el recuento de glóbulos rojos
- Pérdida del apetito
- Cambios en las deposiciones (estreñimiento o diarrea)
- Vómitos
- Niveles bajos en el recuento de plaquetas
- Infección urinaria
- Pérdida de peso
- Dolor abdominal

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de PLUVICTO. Llame a su médico para obtener información sobre los efectos secundarios. Le recomendamos que informe a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta bajo receta. Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.

**Consulte la Información de Prescripción completa.**

