

# 每次接受 PLUVICTO 后， 我需要注意什么？

## 1. 帮助减少您自己和他人受到的辐射暴露

接受 PLUVICTO 后，您的身体、血液、汗液和尿液会在一段时间内释放辐射。因此，请务必遵守这些指示。对于所有这些指示，请将**第 1 天**作为您接受 PLUVICTO 后的首日。



### 保持补充水分

用药后首日大量饮水并尽可能多地排尿（小便）



### 与他人保持 3 英尺以上的距离

用药后 2 日内与其他成年人保持该距离

用药后 7 日内与 18 岁以下儿童或孕妇保持该距离



### 独自睡在单独卧室内

用药后 3 日内与其他成年人分房睡

用药后 7 日内与儿童分房睡

用药后 15 日内与孕妇分房睡



### 用药后先避免性生活，然后采取有效的避孕措施

用药后 7 日内避免性生活

在您的治疗过程中以及最后一次用药后 14 周内采取有效的避孕措施避免怀孕



### 小心使用洗手间

使用独立洗手间（如果可能的话），使用后擦拭干净

用药后 2 日内使用厕所时需始终采取坐姿，每次都使用并冲走厕纸

用药后 3 日内当有人在洗手间协助您时，对方需戴上一次性手套



### 每天淋浴

用药后 7 日内每天至少淋浴一次



### 衣物分开洗涤

在治疗期间您的衣物需与他人的衣物分开洗涤

**注意治疗可能会导致不孕**

## 2. 在治疗期间和治疗后注意副作用

告知医生您所出现的任何副作用，因为医生可能会采取一些措施来帮助您。

### PLUVICTO 最常见的副作用是：

- 疲倦
- 食欲不振
- 血小板计数偏低（比平时更容易出血或瘀伤）
- 口干
- 排便变化（便秘或腹泻）
- 尿路感染
- 恶心（腹痛）
- 呕吐
- 体重减轻
- 红细胞计数偏低（感觉虚弱或气短）
- 腹部疼痛（腹痛）

## 3. 与医生预约下一次的血液检查时间

您需要在下次接受 PLUVICTO 前的 1-2 周再次进行血液检查。

如需了解更多信息，请访问我们的网站  
[PLUVICTO.com](http://PLUVICTO.com) 或联系您的医生

请参阅背面的“重要安全信息”。

 **PLUVICTO**<sup>®</sup>  
lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan  
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE

# 重要安全信息

## PLUVICTO® (lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan) 是什么?

PLUVICTO 是一种放射性药物，用于治疗成人晚期癌症，即前列腺特异性膜抗原阳性转移性去势抵抗性前列腺癌（PSMA 阳性 mCRPC），该癌症：

- 已扩散到身体的其他部位（转移性），并且
- 已经接受过其他抗癌治疗

## 重要安全信息

### 关于 PLUVICTO 我应该知道的最重要信息是什么?

使用 PLUVICTO 时会接触到放射性物质。长期累积的辐射暴露与癌症风险增加相关。

为尽量减少接受 PLUVICTO 后对他人的辐射暴露，应在用药后 2 日内限制与家人密切接触（距离小于 3 英尺），或用药后 7 日内限制与儿童和孕妇密切接触，用药后 7 日内避免性生活，用药后 3 日内与家人分房睡，用药后 7 日内与儿童分房睡，或用药后 15 日内与孕妇分房睡。

### PLUVICTO 可能会引起严重的副作用，包括：

- **血细胞计数水平偏低。**如果您出现任何包括以下情况在内的新症状或恶化症状，请立即告知您的医生：
  - 疲倦或虚弱
  - 肤色苍白
  - 呼吸短促
  - 比平时更容易出血或瘀伤或止血困难
  - 频繁感染并伴有发烧、发冷、喉咙痛或口腔溃疡等症状
- **肾脏问题。**如果您出现任何新症状或恶化症状，包括排尿次数减少或排尿量明显少于平时，请立即告知您的医生

### 在接受 PLUVICTO 前，请告知您的医生您是否出现以下情况：

- 您的血细胞计数（血红蛋白、白细胞计数、中性粒细胞绝对计数、血小板计数）水平偏低
- 您现在或曾经出现过疲倦、虚弱、肤色苍白、呼吸短促、比平时更容易出血或瘀伤或止血困难，或频繁感染并伴有发烧、发冷、喉咙痛或口腔溃疡等症状（可能是骨髓抑制的症状）

- 您现在或曾经出现过肾脏问题
- 您患有或曾经患有任何其他类型的癌症或接受过癌症治疗，因为 PLUVICTO 会增加您的长期累积辐射暴露
- 您的性生活活跃，因为：
  - 包括 PLUVICTO 在内的所有放射性药物都有可能对胎儿造成伤害
  - 在使用 PLUVICTO 治疗期间以及最后一次用药后的 14 周内，您应在性交时采取有效的避孕措施
  - PLUVICTO 可能会导致暂时或永久性不孕

在接受 PLUVICTO 前，您应该大量饮水，以便在用药后的最初几个小时内尽可能多地排尿。

### PLUVICTO 最常见的副作用包括：

- 疲倦
- 口干
- 恶心
- 红细胞计数偏低
- 食欲不振
- 排便变化（便秘或腹泻）
- 呕吐
- 血小板计数偏低
- 尿路感染
- 体重减轻
- 腹部疼痛

以上并非 PLUVICTO 可能产生的所有副作用。请致电您的医生获取有关副作用的建议。我们鼓励您向美国食品药品监督管理局 (FDA) 报告处方药的负面副作用。请访问 [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch)，或致电 1-800-FDA-1088。

请参阅处方信息全文。

