

每次服用 PLUVICTO® 后 我需要知道什么？

1. 帮助减少自己和他人的辐射暴露

- 在接受 PLUVICTO 治疗后，您的身体、血液和尿液会释放辐射一段时间。因此，遵循这些说明非常重要。对于所有这些说明，将第 1 天算为您获得 PLUVICTO 后的一天。



保持水分

1 天内大量饮水并尽可能多地排尿（撒尿）



单独在单独的卧室睡觉

与其他成年人隔离 3 天

与儿童隔离 7 天

与孕妇隔离 15 天



与他人保持 3 英尺以上的距离

远离其他成年人 2 天

远离儿童或孕妇 7 天



一开始不要发生性行为，然后采取有效的避孕措施

7 天不要发生性行为

在治疗期间以及最后一次服药后 14 周内，请采取有效的避孕措施以避免怀孕

治疗可能导致不孕

2. 治疗期间和治疗后要注意副作用

告诉医生您出现的任何副作用，因为他们可能会提供帮助。

PLUVICTO 最常见的副作用包括：

- 血细胞计数减少
- 疲乏
- 口干
- 恶心
- 食欲下降
- 关节疼痛
- 便秘
- 背痛

3. 与医生预约下次验血

您需要在下次使用 PLUVICTO 前 1-2 周再次进行血液检查。

欲了解更多信息，请
访问 [PLUVICTO.com](https://www.pluvicto.com)
或联系您的医生。

请参阅下一页的重要安全信息和完整的处方信息。

 **PLUVICTO®**
lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE

重要安全信息

PLUVICTO® (lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan) 是什么？

PLUVICTO 是一种处方治疗药物，用于治疗已接受以下治疗的前列腺特异性膜抗原阳性转移性去势抵抗性前列腺癌（PSMA 阳性 mCRPC）的成年人：

- 激素治疗或
- 激素治疗和化疗

重要安全信息

关于 PLUVICTO 我应该知道的最重要信息是什么？

使用 PLUVICTO 时会接触到放射性物质。长期累积的辐射暴露与癌症风险增加相关。在给药后的最初几个小时内，尽可能多地喝水和排尿。

为了尽量减少服用 PLUVICTO 后对他人的辐射暴露，请限制与家庭成员 2 天内的密切接触（距离少于 3 英尺），或限制与儿童和孕妇 7 天内的密切接触。7 天内不要进行性活动，3 天内不要与家人接触，7 天内不要与儿童接触，15 天内不要与孕妇接触，分开卧室睡觉。

PLUVICTO 可能会引起严重的副作用，包括：

血细胞计数水平偏低。如果您出现任何包括以下情况在内的新症状或恶化症状，请立即告知您的医生：

- 疲劳或虚弱
- 皮肤苍白
- 呼吸急促
- 比平时更容易出血或瘀伤或止血困难
- 频繁感染并伴有发烧、发冷、喉咙痛或口腔溃疡等症状

肾脏问题。在治疗前后，您应该保持充足的水分。如果您出现任何新的或恶化的泌尿症状，请立即告知您的医生。

包括 PLUVICTO 在内的所有放射性药物都有可能对胎儿造成伤害。

- 在使用 PLUVICTO 治疗期间以及最后一次用药后的 14 周内，您应采取有效的避孕措施

PLUVICTO 可能会导致暂时或永久性不孕。

PLUVICTO 最常见的副作用包括：

- 血细胞计数减少
- 疲乏
- 口干
- 恶心
- 食欲下降
- 关节疼痛
- 便秘
- 背痛

以上并非 PLUVICTO 可能产生的所有副作用。请致电您的医生获取有关副作用的建议。我们鼓励您向美国食品药品监督管理局 (FDA) 报告处方药的负面副作用。请访问 www.fda.gov/medwatch，或致电 1-800-FDA-1088。

请查看完整处方信息。