

¿Qué debo saber DESPUÉS DE CADA DOSIS DE PLUVICTO®?

1. Ayude a reducir la exposición a la radiación para usted y para los demás

- El cuerpo, la sangre y la orina emiten radiación durante un tiempo después de recibir PLUVICTO. Por lo tanto, es importante seguir estas instrucciones. En todas estas instrucciones, cuente el Día 1 como el día después de recibir PLUVICTO.



Manténgase hidratado

Durante 1 día, beba mucho líquido y orine (haga pis) todo lo que pueda.



Duerma solo en un dormitorio separado

Durante 3 días, lejos de otros **adultos**

Durante 7 días, lejos de los **niños**

Durante 15 días, lejos de **mujeres embarazadas**



Manténgase a más de 3 pies de distancia de los demás

Durante 2 días, de otros **adultos**

Durante 7 días, de **niños** o **mujeres embarazadas**



No tenga relaciones sexuales al principio y luego use un método anticonceptivo eficaz

Durante 7 días, no tenga relaciones sexuales.

Durante el tratamiento y durante 14 semanas después de la administración de la última dosis, use un método anticonceptivo eficaz para evitar un embarazo.

El tratamiento puede causar infertilidad

2. Esté atento a los efectos secundarios durante el tratamiento y después de él

- Informe a su médico acerca de cualquier efecto secundario que tenga, ya que tal vez pueda ayudarlo.

Los efectos secundarios más frecuentes de PLUVICTO incluyen los siguientes:

- Disminución de los recuentos de células sanguíneas
- Pérdida del apetito
- Cansancio
- Dolor articular
- Boca seca
- Estreñimiento
- Náuseas
- Dolor de espalda

3. Planifique su próxima cita para un análisis de sangre con su médico

- Tendrá que volver a hacerse análisis de sangre 1 o 2 semanas antes de la próxima vez que reciba PLUVICTO.

Para obtener más información,
visite [PLUVICTO.com](https://www.pluvicto.com)
o comuníquese con su médico.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en la página siguiente y la Información de prescripción completa.

 **PLUVICTO®**
lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es PLUVICTO® (lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan)?

PLUVICTO es un tratamiento con receta para tratar a adultos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración positivo para el antígeno de membrana específico de la próstata (CPRCm positivo para PSMA [prostate-specific membrane antigen]) que ya recibieron tratamiento con:

- terapia hormonal o
- terapia hormonal y quimioterapia

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante acerca de PLUVICTO que debo conocer?

El uso de PLUVICTO implica exposición a radiactividad. La exposición a la radiación acumulada a largo plazo se asocia con un aumento del riesgo de cáncer. Beba abundante agua y orine con la mayor frecuencia posible durante las primeras horas después de la administración.

Para minimizar la exposición a la radiación de otras personas después de la administración de PLUVICTO, limite el contacto cercano (menos de 3 pies) con las personas en su hogar durante 2 días, o con niños y mujeres embarazadas durante 7 días. Absténgase de mantener actividad sexual durante 7 días y duerma en un dormitorio separado de las personas en su hogar durante 3 días, de los niños durante 7 días o de las mujeres embarazadas durante 15 días.

PLUVICTO puede causar efectos secundarios graves, tales como los siguientes:

Bajo nivel de recuentos de células sanguíneas. Informe a su médico de inmediato si tiene algún síntoma nuevo o que empeora, incluidos los siguientes:

- Cansancio o debilidad
- Piel pálida
- Falta de aire
- Sangrado o formación de moretones con más facilidad de lo normal o dificultad para detener el sangrado
- Infecciones frecuentes con signos como fiebre, escalofríos, dolor de garganta o úlceras bucales

Problemas renales. Debe mantenerse bien hidratado antes y después del tratamiento. Informe a su médico de inmediato si tiene algún síntoma urinario nuevo o que empeora.

Todos los radiofármacos, incluido PLUVICTO, tienen el potencial de **causar daños a un feto**.

- Debe usar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con PLUVICTO y por 14 semanas después de la administración de la última dosis

PLUVICTO puede causar **infertilidad** temporal o permanente.

Los efectos secundarios más frecuentes de PLUVICTO incluyen los siguientes:

- Disminución de los recuentos de células sanguíneas
- Cansancio
- Boca seca
- Náuseas
- Pérdida del apetito
- Dolor articular
- Estreñimiento
- Dolor de espalda

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de PLUVICTO. Llame al médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios. Le pedimos que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al [1-800-FDA-1088](tel:1-800-FDA-1088).

Consulte la [Información de prescripción](#) completa.