

No es un paciente real.

# Aproveche al máximo su próxima cita

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en el documento y la Información de prescripción completa.

 **PLUVICTO**<sup>®</sup>  
lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan  
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE

# Pensar en su próximo tratamiento para el CPMRC

## Buscar otra opción de tratamiento para su cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPMRC) puede ser un desafío

Hay mucho que considerar a la hora de decidir su próximo tratamiento con su médico. Sin embargo, puede ser útil prepararse para hablar con su médico sobre lo que sigue en su tratamiento.

Hay varias opciones de tratamiento disponibles que podrían beneficiarlo en este paso de su recorrido. Una vez que haya recibido tratamiento con un tipo de quimioterapia y un inhibidor de la vía del receptor de andrógenos, la terapia con radioligandos (TRL) podría ser una opción.

Esta guía puede ayudarlo a tener una conversación significativa con su médico acerca de su próxima elección de tratamiento y si la TRL es adecuada para usted. Recuerde que su equipo de tratamiento está aquí para responder a cualquier pregunta que tenga.

### ¿Qué es PLUVICTO® (lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan)?

PLUVICTO es un radiofármaco utilizado para tratar a adultos con cáncer avanzado llamado cáncer de próstata metastásico resistente a la castración positivo para el antígeno de membrana específico de la próstata (CPRCm positivo para PSMA [prostate-specific membrane antigen]) que:

- se ha diseminado a otras partes del cuerpo (metastásico); y
- ya ha sido tratado con otros tratamientos antineoplásicos

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

#### ¿Cuál es la información más importante acerca de PLUVICTO que debo conocer?

El uso de PLUVICTO implica exposición a radiactividad. La exposición a la radiación acumulada a largo plazo se asocia con un aumento del riesgo de cáncer.

Para minimizar la exposición a la radiación de otras personas después de la administración de PLUVICTO, limite el contacto cercano (menos de 3 pies) con los contactos domésticos durante 2 días o con niños y mujeres embarazadas durante 7 días; evite la actividad sexual durante 7 días y duerma en un dormitorio separado de los contactos domésticos durante 3 días, de los niños durante 7 días o de las mujeres embarazadas durante 15 días.

#### PLUVICTO puede causar efectos secundarios graves, tales como los siguientes:

- **Bajo nivel de recuentos de células sanguíneas.** Informe a su médico de inmediato si tiene algún síntoma nuevo o que empeora, incluidos los siguientes:
  - Cansancio o debilidad
  - Piel pálida
  - Falta de aire
  - Sangrado o formación de moretones con más facilidad de lo normal o dificultad para detener el sangrado
  - Infecciones frecuentes con signos como fiebre, escalofríos, dolor de garganta o úlceras bucales
- **Problemas renales.** Informe a su médico de inmediato si presenta algún síntoma nuevo o empeoramiento de los síntomas, como orinar con menos frecuencia u orinar en cantidades mucho menores de lo habitual.

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en el documento y la Información de prescripción completa.

# Cómo prepararse para hablar con su médico sobre su próximo tratamiento



## Recuerde que usted es su mejor defensor

Realizar su propia investigación sobre los tratamientos disponibles para el CPMRC puede ayudar cuando hable con su médico sobre su próxima opción de tratamiento.

Su investigación también puede ayudarlo a comprender qué es la TRL y cómo funciona. Venga preparado para compartir con su médico la información que ha obtenido.

Solo usted puede decirle a su médico cómo se siente y qué es lo más importante en su vida. Hable honestamente con su médico sobre lo que es importante para usted.



## Considere llevar a alguien con usted

Es importante recordar los detalles y tener apoyo emocional cuando hable con su médico. Pedirle a un familiar o amigo que lo acompañe a su próxima cita puede ayudarlo a llevar un registro de todo sobre lo que habla.



## Prepare sus preguntas

Asegúrese de hacer todas las preguntas que surjan de su investigación.

También hay preguntas en esta guía que pueden ayudarlo a hablar con su médico sobre el tratamiento del CPMRC y decidir si la TRL es adecuada para usted.

**Comprender claramente las opciones de tratamiento les ayudará a usted y a su médico a decidir qué es lo mejor para usted**

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en el documento y la Información de prescripción completa.

# Posibles preguntas para hacer durante su visita al médico

## Acerca de la TRL

¿Qué es la TRL? ¿Cómo funciona?

---

---

¿En qué se diferencia la TRL de otros tratamientos?

---

---

## Acerca de una TRL llamado PLUVICTO

En función de mi caso, ¿PLUVICTO es una opción de tratamiento para mi CPMRC?

---

---

¿Qué es el antígeno de membrana específico de la próstata (PSMA)?  
¿Cómo sabré si soy positivo para el PSMA?

---

---

¿Cómo funciona PLUVICTO?

---

---

¿Qué hace que PLUVICTO sea diferente de otros tratamientos que he recibido?

---

---

¿Hay algo que me impida recibir PLUVICTO?

---

---

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en el documento y la Información de prescripción completa.

# Posibles preguntas para hacer durante su visita al médico (continuación)

## Acerca de recibir tratamiento con PLUVICTO

¿Cómo se administra PLUVICTO? ¿Con qué frecuencia?

---

---

¿Qué tipos de resultados puedo esperar con PLUVICTO?

---

---

¿Qué puedo esperar en mi día a día mientras recibo PLUVICTO?

---

---

¿Necesitaré que me realicen análisis de laboratorio o de diagnóstico por imágenes durante el tratamiento?

---

---

¿Tendré que viajar a algún lugar para recibir PLUVICTO?

---

---

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en el documento y la Información de prescripción completa.

# Posibles preguntas para hacer durante su visita al médico (continuación)

## Acerca del inicio del tratamiento con PLUVICTO

¿Cuáles son los próximos pasos si PLUVICTO es adecuado para mí?

---

---

¿Cómo puedo averiguar dónde recibir tratamiento con PLUVICTO?

---

---

¿Mi seguro cubrirá el tratamiento con PLUVICTO?

---

---

¿Qué debo tener en cuenta al planificar el viaje hacia y desde el tratamiento?

---

---

¿Hay alguna medida que deba tomar en mi hogar mientras recibo tratamiento con PLUVICTO?

---

---

¿Cuánto me costará el tratamiento con PLUVICTO?

---

---

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en el documento y la Información de prescripción completa.

# Posibles preguntas para hacer durante su visita al médico (continuación)

## Después del tratamiento con PLUVICTO

¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios frecuentes de PLUVICTO?  
¿Cómo se manejan?

---

---

Si tengo inquietudes o experimento algún efecto secundario, ¿a quién debo llamar?

---

---

## Qué esperar después de hablar con su médico

Prepararse para su cita le ayudará, pero aún hay mucha información para comprender y recordar antes de comprometerse con su próximo tratamiento. Llame a su médico si tiene alguna pregunta nueva que pueda surgir después de su visita.

**Explore el sitio web de pacientes de PLUVICTO para obtener más información**

Visite [pluvicto.com](http://pluvicto.com)

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en el documento y la Información de prescripción completa.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

## (continuación)

### **Antes de recibir PLUVICTO, informe a su médico si cumple alguno de estos requisitos:**

- Tiene un nivel bajo de recuentos de glóbulos sanguíneos (hemoglobina, recuento de glóbulos blancos, recuento absoluto de neutrófilos, recuento de plaquetas)
- Tiene o ha tenido cansancio, debilidad, piel pálida, falta de aire, sangrado o formación de moretones con más facilidad de lo normal o dificultad para detener el sangrado, o infecciones frecuentes con signos como fiebre, escalofríos, dolor de garganta o úlceras bucales (posibles signos de mielodepresión)
- Tiene o ha tenido problemas renales
- Tiene o ha tenido algún otro tipo de cáncer o tratamiento contra el cáncer, ya que PLUVICTO contribuye a su exposición acumulada a largo plazo a la radiación
- Usted es sexualmente activo, ya que:
  - Todos los radiofármacos, incluido PLUVICTO, tienen el potencial de causar daños a un feto
  - Debe usar métodos anticonceptivos eficaces para las relaciones sexuales durante el tratamiento con PLUVICTO y durante 14 semanas después de la administración de la última dosis
  - PLUVICTO puede causar infertilidad temporal o permanente

**Antes de la administración de PLUVICTO, debe** beber mucha agua para orinar con la mayor frecuencia posible durante las primeras horas posteriores a la administración.

### **Los efectos secundarios más frecuentes de PLUVICTO incluyen los siguientes:**

- Cansancio
- Boca seca
- Náuseas
- Recuento bajo de glóbulos rojos
- Pérdida del apetito
- Cambios en las deposiciones (estreñimiento o diarrea)
- Vómitos
- Recuento bajo de plaquetas en sangre
- Infección de las vías urinarias
- Pérdida de peso
- Dolor abdominal

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de PLUVICTO. Llame al médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios. Le recomendamos que informe a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al [1-800-FDA-1088](tel:1-800-FDA-1088).

**Consulte la Información de prescripción completa.**







# Glosario de términos importantes

La **tasa de respuesta general** se define como el porcentaje de pacientes en un ensayo clínico que responden a su tratamiento asignado.

---

La **supervivencia general** se define como el tiempo total que los pacientes del ensayo clínico estaban vivos desde el inicio del tratamiento.

---

**Tomografía por emisión de positrones (TEP):** Tipo de diagnóstico por imagen que produce imágenes de órganos y tejidos en funcionamiento. Se puede usar para encontrar células cancerosas dentro del cuerpo.

---

La **supervivencia sin progresión** se define como el tiempo que un paciente de un ensayo clínico vive sin que su enfermedad empeore después de que se le haya administrado un tratamiento.

---

**PSMA:** El antígeno de membrana específico de la próstata, o PSMA, es un biomarcador proteico que se encuentra en cantidades más altas en las células del cáncer de próstata. Las células positivas para PSMA (PSMA+) se identifican en una TEP de PSMA.

---

**Terapia con radioligandos (TRL):** Tratamiento de radiación que se dirige a células específicas, incluidas las células cancerosas.

---



No son pacientes reales.

# Nunca es demasiado tarde hacer preguntas **que son importantes para usted**

Obtenga más información sobre PLUVICTO

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en el documento y la Información de prescripción completa.



Novartis Pharmaceuticals Corporation  
East Hanover, New Jersey 07936-1080

© 2024 Novartis



7/24

FA-11233020